

根据我校军队卫生教研室、上海市杨浦区防疫站、宝山县防疫站对“84—1型洗消剂”进行了实验室与现场消毒试验后所提供的数据证明：消毒去污效果理想，各种餐食具在含有效氯100ppm的溶液中浸洗2~5分钟，可杀灭Coli 258f₂噬菌体、枯草杆菌、大肠杆菌99.99%~100%，400ppm水溶液5分钟可杀灭4001芽胞99.99~100%。现场实验可满足客流量1000人次/天的饮食店餐食具洗消、消毒的需要，效果确切可靠。

3. 安全性评价

本洗消剂甲、乙型按国家卫生部下发的《食品安全性毒理学评价程序》进行了急性试验：甲型LD₅₀ = 7.2克/公斤，乙型LD₅₀ = 3.7克/公斤。致突变试验：甲、乙两型对组氨酸缺陷型鼠伤寒沙门氏菌TA₉₈和TA₁₀₀无诱变性。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

· 文摘 ·

局部用色甘酸盐治疗慢性湿疹

色甘酸钠是一种平喘药，临床上用于预防季节性哮喘或治疗支气管哮喘，然而英国布赖顿医院和综合门诊部的医生以局部用色甘酸钠治疗轻度及中等程度湿疹取得了明显的疗效，可以减少甾体化合物的需要。

J.M.Harris 医生等和药局将4%色甘酸钠乳剂(O/W)涂在一组患有慢性异性湿疹的成人和儿童的患处，每日用药二次，疗程为12周，并用安慰剂乳膏对照观察。结果表明，用药治疗组与对照组比较，湿疹有明显的好转，同时还观察到开始用药

时疗效并不明显，九周后作用越来越显著。对于严重的湿疹效果还不理想。作者另对22位患有严重湿疹的病人采用色甘酸钠连续治疗1年，大多数患者的症状保持明显的好转，急性加剧的发生率趋于降低。

鉴于局部应用色甘酸钠治疗湿疹的结果复杂，作者认为有必要进一步研究。

[The Pharmaceutical Journal《药学杂志》，April 20, 508, 1985(英文)]

柯宁宁译 张紫洞校

甲磺丁脲与心得安、美多心安

应用安慰剂、心得安(80mg、每天两次连用两周)和美多心安(100mg、每天两次连用两周)对甲磺丁脲所诱发胰岛素分泌的影响进行了研究。非胰岛素引起高血压的糖尿病和高血压非糖尿病的患者已进行双盲交叉研究。在每次治疗结束时进行了静注200mg甲磺丁脲的耐受性试验。

结果发现，甲磺丁脲刺激胰岛素的分泌不受β-阻断剂的影响。而且发现在糖尿病与非糖尿病

患者中，接受安慰剂或β-阻断剂后，其胰岛素或葡萄糖对甲磺丁脲试验的效应无显著性差异。

上述结果与以前报道的不一致。以往曾有报道，β-阻断剂与磺酰脲类可产生明显的临床相互作用。

[AJP《澳大利亚药理学杂志》，64(764): 792, 1983(英文)]

苏开仲译 张紫洞校