

为33:3天。用法：肌注每次20~40 mg，每日1次，疗程1个月，或静滴15次为一疗程，每日1次，必要时进行第2疗程，疗程间隔3~5天，同时每日外用1/万芥子气软膏2次。

十九、治疗各种血管性疾病

本品对脑血栓、脑栓塞、脑血管痉挛、血管神经性头痛、血栓闭塞性脉管炎等均有一定疗效。治疗脑血栓时每日30~40 mg，加入5%葡萄糖液中静滴，治疗血栓闭塞性脉管炎可每次静注10~15mg，每日1次。

二十、治疗眼底疾患

本品可用于中心性视网膜炎、视网膜色

素变性、眼底动脉阻塞、视神经萎缩等。其0.2%滴眼剂还可试用于青少年近视眼的治疗。

二十一、其它

本品还用于眩晕病、突发性耳聋、神经性皮炎、过敏性鼻炎、荨麻疹等的治疗，大剂量也可用于解除有机磷农药中毒。

山莨菪碱毒性小，对肝、肾无损害。常见副作用有口干、面红、视力模糊等，大剂量时可出现心率加快、排尿困难等反应。出现阿托品样中毒症状时，可用新斯的明解救。脑出血急性期及青光眼患者禁用。

(参考文献略)

老药新用资料索引

空军成都医院 廖名龙

药物	题 目	期 刊 名 称
潘 生 丁	潘生丁可治疗病毒性上感	陕西新医药 9:56,1981
	潘生丁治疗新生儿硬肿症的疗效观察	基层医刊 6:16,1983
	潘生丁治疗小儿疱疹性咽峡炎观察	人民军医 1:51,1984
	复方丹参潘生丁治疗重症新生儿硬肿症	基层医刊 2:12,1984
	潘生丁治疗小儿上呼吸道感染120例	福建医药 3:53,1984
	潘生丁治疗新生儿硬肿症疗效观察	临床医学杂志 2:36,1985
	潘生丁治疗小儿病毒性上呼吸道感染疗效观察	实用医学杂志 2:42,1985
	阿司匹林潘生丁治成人溶血尿毒综合症一例	吉林医学 2:43,1985
维生素潘生丁治疗肾炎67例	实用内科杂志 4:251,1985	
心 得 安	心得安治疗高血压机理及注意点	辽宁中级医刊 5:48,1979
	心得安治疗13例精神分裂症的近期疗效	山东医药 4:28,1980
	心得安治疗流行性出血热的临床研究	南京医学院学报 3:39,1982
	心得安治疗再障性贫血的实验研究及临床初步报告	新 医 学 1:36,1984
	心得安等治疗偏头痛	贵阳医药 2:42,1984
	心得安对门脉高压上消化道出血的防治	国外医学外科学分册4:205,1984
	心得安的新用途	医师进修杂志 6:24,1984
	心得安治疗流行性出血热急性肾功能不全疗效分析	江苏医药 10:12,1984
	心得安是有效的阴道内避孕药	国外医学情报 14:237,1984
	心得安防治食道静脉曲张再出血	浙江医科大学学报 2:89,1985
食道静脉曲张出血的硬化疗法及心得安治疗	医师进修杂志 6:5,1985	

氯丙嗪	氯丙嗪治疗急性左心衰	中华内科杂志	12:762, 1981
	氯霉素合氯丙嗪治疗百日咳效果好	中原医刊	1:6, 1984
	氯丙嗪的临床新应用	徽州医学	1:902, 1984
	小剂量氯丙嗪治疗大咯血	新医学	3:139, 1984
	中等剂量氯丙嗪治疗早泄	中华泌尿外科杂志	1:56, 1985
	氯丙嗪治疗顽固性急性肺水肿二例	中国急救医学	1:56, 1985
胃复安	灭吐灵能刺激催乳素的分泌	新医学	3:168, 1981
	胃复安治疗晕车100人次	新药与临床	1:39, 1984
	灭吐灵治疗精神分裂症	四川医学	3:180, 1984
	胃复安口服治愈输入袢综合征一例	新药与临床	6:44, 1984
	胃复安的新用途	医师进修杂志	9:35, 1984
	胃复安催乳有效	新医学	11:569, 1984
普鲁卡因	老年维生素H ₃ 的秘密	大众医学	2:6, 1981
	抗老药——普鲁卡因	国外医学老年医学分册	1:17, 1981
	奴夫卡因治疗咯血	山东医药	1:40, 1984
	普鲁卡因滴鼻净治疗电光性眼炎疗效观察	眼外伤与职业性眼病杂志	3:177, 1984
	普鲁卡因心脏表面滴注提高心率	中华麻醉学杂志	4:207, 1984
	复方普鲁卡因治疗带状疱疹后遗神经痛	临床皮肤科杂志	2:107, 1985
奴夫卡因注入天柱穴治疗阳明头痛68例	白求恩医科大学学报	2:190, 1985	
卡介苗	灭活卡介苗治疗哮喘性支气管炎的疗效和原理初探	中华儿科杂志	16:90, 1978
	死卡介苗治疗支气管哮喘100例疗效观察	广州医药	2:16, 1984
	口服死卡介苗预防小儿呼吸道感染	北京医学	2:97, 1984
	应用卡介苗治疗慢肝	中原医刊	3:11, 1984
	死卡预防慢支205例12年随访观察	湖南医学	2:1, 1985
	卡介苗对浅表性膀胱移行细胞癌术后复发的预防作用	陕西新医药	3:56, 1985
死卡接种治疗小儿哮喘远期观察	江西医药	5:19, 1985	
α-受体阻断剂	应用酚妥拉明治疗小儿肺炎	湖南医学	1:10, 1984
	酚妥拉明等治疗流行性出血热并发高血容量综合征	开封医药	1:30, 1984
	苄胺唑啉治疗难治性心力衰竭	贵州医药	3:24, 1984
	酚苄明治疗急性心力衰竭的探讨	沈阳医学	3:24, 1984
	苄胺唑啉治疗ARDS的机理实验研究	中华结核和呼吸系统疾病杂志	3:143, 1984
	酚妥拉明治疗产后尿潴留	江苏医药	4:7, 1984
	应用酚妥拉明或东莨菪碱治疗大咯血	临床内科杂志	4:47, 1984
	小剂量酚妥拉明治疗慢性肺心病心力衰竭	福建医药杂志	5:5, 1984
	苄胺唑啉治疗流行性出血热急性肾衰60例观察	四川医学	6:358, 1984
酚妥拉明治疗高血压危象	医师进修杂志	9:46, 1984	

	酚苄明及新斯的明对前列腺增生相对排尿阻力的影响	医学研究通讯	10:23, 1984
	酚妥拉明与消心痛联合口服治疗高原心脏慢性充血性心力衰竭33例疗效观察	新医学	11:584, 1984
	酚妥拉明超声雾化吸入治疗肺心病急发期支气管哮喘30例	广西医学	2:76, 1985
	酚妥拉明消心痛治疗心力衰竭100例	河北医药	2:82, 1985
雌 激 素	复方炔诺酮治疗银屑病	江西医药	2:59, 1984
	炔雌醇治疗肿瘤病人放疗白细胞减少的临床评价	肿瘤临床	2:76, 1984
	黄体酮衍生物对输尿管结石的排石作用	江苏医药	4:41, 1984
	黄体酮治疗输尿管结石的初步临床总结	贵州医药	5:1, 1984
	黄体酮治疗输尿管和后尿道结石30例疗效观察	武汉医学杂志	1:61, 1985

钙通路阻滞剂的新用途

桂林南溪山医院

杨俊何

钙通路阻滞剂（钙拮抗剂）是近十多年来发展的一类新药。本类药物选择性阻滞慢通道从而抑制细胞膜对 Ca^{2+} 的转运功能、舒张冠脉平滑肌、增加心肌血流、扩张外周血管、减少周围阻力、降低动脉压、减少心脏后负荷和耗氧量，大剂量可减弱心肌收缩力以保护能量。所有这些作用能使心肌缺血引起的代谢障碍得以缓和，因而这类药物对高血压、心绞痛和心律失常等心血管疾病有明显的疗效。由于钙通路阻滞剂的降压效果平稳，又能兼治高血压的并发症，故其价值优于其他降压药。本文就这类药物发现的新用途作简单叙述。

治疗雷诺氏现象

雷诺氏现象（包括雷诺氏病和雷诺氏综合征）以发作性指（趾）苍白、发紫、反应性潮红、血管痉挛为主要临床表现。钙通路阻滞剂硫氮革酮（diltiazem）和硝苯吡啶（nifedipine）能改善雷诺氏现象的临床和自觉症状。

6例雷诺氏病和10例雷诺氏综合征患者

在双盲交叉试验中分别接受硝苯吡啶 20mg 和安慰剂，于给药后 1 和 6 小时用冷浸试验（4℃水，30分钟）判断效果：症状发作时间在 5 分钟以后者为最佳，3~5 分钟者为良好，3 分钟内者为无效。结果表明安慰剂期全部无效，硝苯吡啶期 16 例中良好以上者 14 例。给 10 例病人应用硝苯吡啶（20mg, tid）冬季试验 3 个月，平均每周发作次数从治疗前的 29.5 减至 4.3，其中 4 例全期无发作。另一双盲交叉试验表明，17 例雷诺氏现象患者口服硝苯吡啶（每二周 1~4 次，每次 40mg）或安慰剂。每天症状发作次数，硝苯吡啶期（ 1.3 ± 0.3 ）比安慰剂期（ 2.5 ± 0.4 ）明显减少。

26 例雷诺氏病患者，随机平均分成 2 组，分别接硫氮革酮（60mg, tid）或安慰剂，连续试验 2 周。改善率：治疗组 51%，对照组 17%。另一组类似病人共 17 例，口服硫氮革酮（30mg, tid），6 周内患者的自觉症状改善 69.6%，冷浸试验（10℃，10 分钟）的复温率明显增加。99 例病人进行双盲