

周, 一个疗程为 19 d。

疗程一结束, 由于铅从骨中重新分布至软组织和血液, 血铅水平可能迅速回升, 同时出现症状, 因此, 治疗结束后, 应至少每周测定一次血铅水平以监测血铅的反弹直至稳定。除非血铅水平较高需及时治疗, 一般疗程间至少间隔 2 周。

无论是否使用二巯基丙醇, 已用过依地酸钙二钠者, 间隔 4 周后, 方可用本品继续治疗。本品合用其它螯合剂的疗法尚未全面研究, 故不推荐。

本品胶囊为 100 mg, 如幼儿不能吞咽, 可打开胶囊, 将含药颗粒撒在少量软食上或放在调羹中, 用果汁送服。

(全文完)

壮骨关节丸引起药物性肝内胆汁淤积型肝炎 1 例

解放军第三〇二医院 (北京 100039) 刘丽萍

患者, 男 34 岁, 住院号 129047。因腰椎骨质增生在院外治疗, 服用壮骨关节丸。用药 20d 后出现腹胀、纳差, 尿黄和皮肤瘙痒等症状。肝功能检查谷丙转氨酶 62μ ($<30\mu$ 为正常), TTT 30μ , Bil $344/254\mu\text{mol/L}$ 。患者经本院实验室检查, 排除甲、乙型及其它类型病毒性肝炎感染指标, 经肝穿证实为药物性肝炎肝内胆汁淤积型。患者服用壮骨关节丸以前或用药中未服用或伍用其它药物, 可确

证为壮骨关节丸引起的肝炎损伤。该患者入院后停用该药, 并服用保肝药及辨证中药治疗后好转出院。

壮骨关节丸系南方制药厂生产, 药物成分为狗脊、淫羊藿、独活、骨碎补、木香、鸡血藤、川断、熟地。动物实验和长期临床应用表明本品无毒副作用。而本例药物性肝损伤则提请人们注意该药的副作用。引起肝损伤的药物成分和机理则有待进一步观察分析。

诺氟沙星致过敏性皮疹一例报道

解放军第 534 医院 (洛阳 471000) 韩广轩

章某, 女, 17 岁, 于 1992 年 4 月 23 日 14h30min 因腹泻、呕吐就诊。诊断为急性细菌性痢疾, 当晚 19h 口服吗叮啉 10mg 和诺氟沙星 0.4g, 吐止, 次晨, 发现患者脸部肿胀, 痒, 潮红。8h30min 第二次口服诺氟沙星 0.2g, 14h 左右脸部, 四肢皮肤出现针尖样红

色皮疹, 奇痒难忍, 脸部浮肿加重, 停药诺氟沙星并给息斯敏 10mg, q.d po., 第 2 天全身奇痒消失, 脸部、四肢皮肤仍有浮肿和皮疹, 继续口服息斯敏 10mg q.d., 3 天后皮疹基本消失。