

· 药物不良反应 ·

关于一例乳母服鲁米那引起婴儿皮疹的报告

秦红霖*

(北京军区药检所 北京 100071)

婴儿三个月,因皮肤出现散在性药斑到医院就诊,医师诊断为药物过敏——药疹,母亲主诉未曾给婴儿服药,婴儿系母乳喂养,未曾接触化学物品及药品,住院观察7d后红斑自行消退。半月余,婴儿再次出现皮肤散在性红斑入院,母亲主诉与上次相同,医师询问其母是否近日服药,乳母主诉前一天晚上因入睡困难口服鲁米那2片,回忆上次乳儿出现

皮疹也是其母口服鲁米那片后出现。医师留患儿住院观察1周红斑自行褪去。

分析讨论:婴儿两次出现药物皮疹均在其母服用鲁米那片后出现,婴儿并未直接接触任何化学物质及药品,说明均只有通过乳汁喂养获得该药。证明患儿对苯巴比妥类药物过敏。因此在给哺乳妇女用药时一定要考虑对婴儿可能产生的不利影响。

头孢拉定致药物性肾炎 1 例

吕继湘 马玉杰 黄春明

(长征医院 上海 200003)

一、病例介绍 患者沈××,男,36岁,本院主治医师,住院号229779。1994年8月27日晚因淋雨受凉,28日凌晨出现咽喉痛、咳嗽、全身肌肉酸痛,体温38℃等急性上呼吸道感染症状,未引起重视。当日晚仍急诊值班。由于劳累,22时上呼吸道感染症状加重,体温升高。就诊后,给予头孢拉定注射液(中美上海施贵宝制药有限公司出品批号4E404)6克加入到10%葡萄糖注射液500ml中,静脉滴注。输入液体量4/5时,患者感到腰部两侧酸痛。立即停药。10分钟后,小便有10ml左右呈血红色血尿。又过10分钟第二次小便仍有10ml血尿。立即静脉注射地塞

米松5毫克,同时5毫克地塞米松针加入到10%葡萄糖注射液500ml中静脉滴注。29日凌晨转入病房。

入院后体征检查:双肺呼吸音粗糙,左侧肺底部可闻细湿罗音。皮肤检查:躯干部散在分布三个针尖大小血管痣。尿液检查:高倍镜下红细胞满视野。尿液生化检查蛋白60mg/dL,红细胞 $>250/\mu\text{L}$ 。初步诊断为药物中毒反应(血尿)和急性上呼吸道感染。确定:继续激素支持疗法;输液加快药物排泄;抗炎抗过敏;保护肝肾功能。29日上午会诊,明确诊断为:急性上呼吸道感染、药物性肾炎(头孢拉定致),按上述治疗方案治疗,特级护理;每日做尿常规,尿生化检查,密切注意肾功能。第三天,尿液检查,高倍镜下,红细胞还有15-

* 本文作者系患儿的母亲