

旦丁可对抗诺氟沙星在尿道中的抗菌作用。诺氟沙星与抗凝血药华法令合用。由于抑制了华法令在肝中代谢,可使后者血药浓度升高,凝血时间延长,引起出血。诺氟沙星与上述药物合用时应予注意。

2.5 给药剂量不益过大,且患者在使用过程中应多饮水,保证有足够尿量。用药后应观察患者的反应,并注意尿样监测,出现不良反应应停药并及早采取相应措施。

参考文献

- 1 王银祥,郭海鱼. 诺氟沙星引起心肾损害 1 例报告. 中国抗生素杂志, 1995, 20(5): 400
- 2 李时悦,乔兆国. 氟喹诺酮类和 WBC 减少症. 中国抗生素杂志, 1995, 20(5): 148
- 3 钟裕. 口服诺氟沙星出现 WBC 减少 1 例. 新药与临床, 1997, 16(2): 116
- 4 张红斌. 诺氟沙星引起 WBC 减少 2 例. 青海医药杂志,

- 1996, 26(10): 38
- 5 韦伟国. 口服诺氟沙星出现震颤麻痹征群 1 例. 新药与临床, 1996, 15(5): 315
- 6 吴彩贤. 氟哌酸致面部、手、足浮肿 2 例. 临床荟萃, 1996, 11(4): 191
- 7 吴昌兰,杨邦英. 氟哌酸眼药水致大疱性药疹 1 例. 安徽医学, 1995, 16(6): 12
- 8 刘继刚. 氟哌酸过敏性口角湿疹 1 例报告. 华西口腔医学杂志, 1997, 15(2): 125
- 9 陈凤林. 口服氟哌酸致视力下降 1 例. 四川医学, 1997, 18(4): 68
- 10 薛贵需,岳俊江. 口服诺氟沙星致成人膝关节疼痛 1 例. 药物流行病学杂志, 1997, 6(1): 25
- 11 姜敏. 口服诺氟沙星胶囊致多发性末梢神经炎. 中国农村医学, 1997, 25(2): 54
- 12 俞荣森. 氟喹诺酮类药物的不良反应相互作用. 中国医院药学杂志, 1992, 12(12): 550
- 13 张燕,李珍大. 4 种氟喹诺酮类药物的耐药性. 新药与临床, 1995, 14(2): 97 (收稿: 1999-05-07)

布洛芬引起严重耳鸣 1 例

刘启萍(济南铁路中心医院 济南 250001)

1 临床资料

患者,女,65a。患骨关节炎多年,因气候因素,关节疼痛剧烈,几乎不能活动。在医生指导下,服用布洛芬(济南永宁制药股份有限公司,批号: 9802242) 0.2g, tid, 24h 后出现头晕、剧烈耳鸣,停药即来就诊。体检: 体温 36.8℃, HR82 次/min, BP17/12kPa, 呼吸平, 双肺、肝、脾正常, 神经系统检查无异常, 既往无药物过敏史。初步诊断: 药物性过敏。停用布洛芬, 给予扑尔敏、维生素 C、葡萄糖酸钙、能量合剂等药物治疗, 24h 后症状消失。为验证该药的不良

反应, 2wk 后再次服有布洛芬(批号相同) 0.2g, bid, 病人又出现以上类似反应, 但症状较轻, 停药 24h 后症状自行消失。据此认为: 出现严重的耳鸣症状为布洛芬所致, 属于布洛芬的药物不良反应。

2 讨论

布洛芬为非甾体类消炎药, 抑制体内前列腺素(PG)的合成, 具有镇痛、退热和抗炎作用。临床常用于缓解关节炎引起的疼痛以及痛经。常见为胃肠道反应, 引起严重耳鸣的不良应较少见。(收稿: 1999-03-05)