

氨茶碱致四肢末梢麻木 1 例

张二箭(解放军 51056 部队门诊部, 张家口 075000)

关键词: 氨茶碱; 不良反应; 末梢麻木

中图分类号: R974⁺.3

文献标识码: B

文章编号: 1006- 0111(2000)01- 0045- 1A

1 临床资料

患者梁某, 女, 27a, 咳嗽, 咯痰伴胸闷 1d, 自服头孢氨苄 0.5, 氨茶碱 0.2, 连服 2 次, 均于服药后 40min 出现四肢末梢麻木, 有蚁走感, 持续 30min 左右, 遂来我院就诊。查四肢末梢无红肿, 未见皮疹, 压痛(-), 肌张力正常, 腱反射正常存在。考虑氨茶碱所致, 故停用氨茶碱, 只服头孢氨苄, 患者再未出现四肢末梢麻木症状, 这可确定为氨茶碱引起的。追问用药史, 患者于 1 年前曾静点氨茶碱 0.25 + 5% 葡萄糖

500ml, 也同样出现上述症状, 但未引起重视。

2 讨论

氨茶碱是临床上常用的平喘药物之一, 其常见的不良反应有恶心、呕吐、头晕、失眠、心悸、心律失常、血压剧降等, 未见有致四肢末梢麻木的报道, 机制也尚不明确, 可能是患者对氨茶碱高度敏感。这尽管无需治疗, 一般停药即可消失, 但也应引起我们的重视。

收稿日期: 1999- 09- 01

口服散利痛致血小板减少性紫癜 1 例

杨贤俊, 胡凤华(解放军第 538 医院, 西乡 723500)

关键词: 散利痛; 血小板减少性紫癜; 不良反应

中图分类号: R971⁺.1

文献标识码: B

文章编号: 1006- 0111(2000)01- 0045- 1B

1 临床资料

患者, 女, 14a。因头痛发热服用自购的散利痛 2 次(共 4 片), 服后周身出现血点及瘀斑来院。查体: T37.4℃, P80 次/min, R20 次/min, BP16.6/9.6kPa。全身皮肤散在大小不等(直径 1~ 10mm)、稀疏不均、边缘较整齐的出血点和瘀斑, 压之不褪色。血常规: 白细胞 $6.5 \times 10^9/L$, 中性 0.67, 淋巴 0.32, 血小板 $46 \times 10^9/L$, 尿常规: 红细胞(+). 诊断为药物性血小板减少性紫癜。停用散利痛, 给予糖皮质激素(iv gtt 氢化可的松 3d 后改服强地松)、止血药及对症

治疗 1wk, 出血点及瘀斑消退, 复查血小板为 $136 \times 10^9/L$ 。

2 讨论

本例患者首次服用散利痛后发生出血倾向, 未用其它药品, 停药后经激素治疗血小板转为正常。病前一直住校读书, 饮食如常, 未接触化学药品。既往体健, 无过敏史及血液病史。故可确定为服用散利痛致血小板减少性紫癜。散利痛为常用解热镇痛药, 应用较广, 可引起血液疾病, 应予警惕。

收稿日期: 1999- 05- 20